

?Inicien una prova pilot d'injectar un químic als arbres per frenar l'eruga del boix

Es tracta d'una tècnica que ja s'ha utilitzat per a la processonària del pi i que ara es vol experimentar amb aquesta espècie invasora que afecta amb gran extensió i grau el Berguedà



La nova tècnica que prova Acció Climàtica consisteix en la injecció del producte químic directament a l'arbre | ACN

L'objectiu és preservar les boxedes d'alt valor natural dels atacs de la papallona del boix. La prova pilot, impulsada pel **Departament d'Acció Climàtica**, ha començat al **Parc Nou d'Olot** i el tractament experimental consisteix a injectar un insecticida al tronc de la planta perquè circuli per la saba, arribi a les fulles i mati les erugues quan se n'alimentin. No és el primer cop que s'utilitza aquesta tècnica anomenada **endoteràpia vegetal** a Catalunya.

El cap del **Servei de Sanitat Vegetal, Jordi Giné**, ha remarcat que s'ha fet servir per combatre altres plagues com la del morrut de les palmeres o la processonària del pi amb resultats "molt positius". "Ara hem començat a fer-ho amb el boix i esperem una eficàcia elevada, però durant un any avaluarem els resultats perquè és una fusta especial i veurem quina persistència té el producte en les fulles", ha afegit.

Acció Climàtica remarca que aplicar el producte directament a l'arbre o arbust **evita polvoritzar insecticida afectant l'entorn i altres espècies**. Si l'assaig surt bé, Giné subratlla que es

comptarà amb una "molt bona tècnica per lluitar contra aquesta plaga en arbres grans" i aconseguir així preservar les boixedes.



Una eruga del boix Foto: NacióDigital

Un estudi fet pel Departament confirma que aquesta espècie invasora ja és present a **193 municipis** de 23 comarques. La papallona ha arribat ja a les comarques de la Segarra i el Baix Camp on fins ara la plaga no era present. Les comarques amb major extensió i grau d'afectació són el **Berguedà**, la Garrotxa, Osona, el Ripollès i el Moianès.

Un 31% dels boixos catalans, afectats

La papallona del boix és una espècie invasora que **s'alimenta de fulles de boix** de jardins i boscos. Els efectes de la plaga són molt impactants perquè deixen els boixos absolutament defoliats, cosa que en compromet la capacitat de supervivència. Les erugues, tot i que provoquen molèsties, **no són urticants ni perilloses per a les persones**.

Es calcula que només a Catalunya ja ha afectat unes **170.000 hectàrees**, un 31% del total de boixos. Les primeres papallones acostumen a volar a partir del mes de juny. D'agost a octubre, la plaga té dues generacions més que fan que sigui molt abundant en ple estiu. Això provoca, també, alarma social per la gran quantitat de papallones atretes per la llum que voleien al voltant de llums en aquesta època de l'any.