

Els 6 símptomes després de rebre les vacunes d'AstraZeneca i Janssen que cal tractar de forma urgent

L'Agència Europea del Medicament demana als sanitaris estar especialment atents els dies posteriors a la punxada



Vacunació al recinte firal el Sucre de Vic | Josep M. Montaner

L'Agència Europea del Medicament (EMA) demana als sistemes sanitaris dels estats membres que estiguin especialment atents a mitja dotzena de símptomes que poden aparèixer després de rebre la vacuna d'AstraZeneca i la de Janssen contra la Covid. L'EMA subratlla que en aquests casos, (<https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-janssen-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood>) detallats a continuació, és necessari que un pacient rebi "atenció mèdica immediata".

[nointext] [intext1]

Concretament, es tracta d'aquests símptomes:

1. Dificultat respiratòria (disnea, sensació de falta d'aire).
2. Dolor al pit (en concret, al costat del cor).
3. Edema/inflamació a les cames.
4. Dolor abdominal persistent.
5. Simptomatologia neurològica (com mal de cap intens i visió borrosa)

6. Hematomes cutanis i petèquies -lesions petites vermelles- en llocs diversos.

[intext2]

L'Agència Europea del Medicament ha confirmat finalment un vincle entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos "remots" de trombosi (<https://www.naciodigital.cat/noticia/218348/ema-confirma-vincle-remot-entre-astrazeneca-trombosi-pero-considera-segura-vacuna>) , així com amb el vaccí de Janssen (<https://www.naciodigital.cat/noticia/218958/ema-avala-us-janssen-pero-incloura-trombes-efecte-secundari-infrequent>) . Assenyala que si bé els coàguls són un efecte secundari, aquests són "infreqüents". És per això que considera que el vaccí contra el coronavirus és segur i recomana que es continuï administrant perquè els beneficis superen els riscos.

[intext3]

[plantillacoronavirus]