

Els 6 símptomes després de rebre el vaccí d'AstraZeneca que cal tractar de forma urgent

L'Agència Europea del Medicament demana als sanitaris estar especialment atents els dies posteriors a la punxada



Dos vials del vaccí d'AstraZeneca. | ACN.

L'Agència Europea del Medicament (EMA) demana als sistemes sanitaris dels estats membres que estiguin especialment atents a mitja dotzena de símptomes que poden aparèixer després de rebre el vaccí d'AstraZeneca contra la Covid.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris subratlla que en aquests casos, detallats a continuació, és necessari que un pacient rebí "atenció mèdica immediata".

Es tracta de:

- ? dificultat respiratòria (disnea, sensació de falta d'aire);
- ? dolor al pit (en concret, al costat del cor);
- ? edema/inflamació a les cames;
- ? dolor abdominal persistent;
- ? simptomatologia neurològica (com mal de cap intens i visió borrosa);
- ? i/o hematomes cutanis i petèquies -lesions petites vermelles- en llocs diversos.

L'Agència Europea del Medicament ha confirmat finalment un vincle entre el vaccí d'AstraZeneca i els casos "remots" de trombosi (<https://www.naciodigital.cat/noticia/218348/ema-confirma-vincle-remot-entre-astrazeneca-trombosi-pero-considera-segura-vacuna>) . Assenyala que si bé els coàguls són un efecte secundari, aquests són "infreqüents". És per això que considera que el vaccí contra el coronavirus és segur i recomana que es continuï administrant perquè els beneficis superen els riscos.

[plantillacoronavirus]