

## Els 6 símptomes després de rebre la vacuna d'AstraZeneca que cal tractar de forma urgent

*L'Agència Europea del Medicament demana als sanitaris estar especialment atents els dies posteriors a la punxada*



Dos vials de la vacuna d'AstraZeneca. | ACN

L'Agència Europea del Medicament (EMA) demana als sistemes sanitaris dels estats membres que estiguin especialment atents a mitja dotzena de símptomes que poden aparèixer després de rebre la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris subratlla que en aquests casos, detallats a continuació, és necessari que un pacient rebi "atenció mèdica immediata".

Es tracta de dificultat respiratòria (disnea, sensació de falta d'aire), dolor al pis (en concret, al costat del cor), edema/inflamació a les cames, dolor abdominal persistent, simptomatologia neurològica (com mal de cap intens i visió borrosa) i/o hematomes cutanis i petèquies -lesions petites vermelles- en llocs diversos.

L'Agència Europea del Medicament ha confirmat finalment un vincle entre la vacuna d'AstraZeneca i els casos "remots" de trombosi (<https://www.naciodigital.cat/noticia/218348/ema-confirma-vincle-remot-entre-astrazeneca-trombosi-pero-considera-segura-vacuna>). Assenyala que si bé els coàguls són un efecte secundari, aquests són "infreqüents". És per això que considera que el vaccí contra el coronavirus és segur i recomana que es continuï administrant perquè els

beneficis superen els riscos.

[plantillacoronavirus]